



Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom: Unsere Zeichen: Durchwahl: Datum:

Merkblatt für Patienten mit Sellink-MRT (Dünndarm)

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient

Sie wurden von Ihrer Ambulanz für eine MRT des Dünndarms angemeldet. Diese Untersuchung erfordert eine spezielle Vorbereitung, um eine optimale Bildqualität und Aussagekraft zu gewährleisten.

Folgende wichtige Punkte sind zu beachten:

Frühestens 4 Wochen vor der Untersuchung

- Aktuelle Laborwerte: Kreatinin

24 Stunden vor der Untersuchung

- Keine Einnahme von fester Nahrung
- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr (Wasser, Tee oder Brühe)

Am Tag der Untersuchung

- Nüchtern bleiben

Es werden bei Ihnen 2 Medikamente eingesetzt:

- *Kontrastmittel*
 - ▶ Dieses werden Sie über einen Zeitraum von etwa 60 Minuten trinken müssen. Es kann eine blähende oder leicht abführende Wirkung haben.
- *Buscopan*
 - ▶ Dieses wird intravenös verabreicht und Sie können sich danach benommen fühlen, weswegen die Mitnahme einer Begleitperson dringend notwendig ist und eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr für mindestens 6 Stunden nicht gestattet ist.

Dauer der Untersuchung:

- Mindestens 4 Stunden

Was müssen Sie mitbringen?

- Krankenhauseinweisungsschein/Überweisungsschein und Krankenversichertenkarte
 - ▶ **Uniklinik-interne ambulante Patienten:** Sollten Sie in Ihrer Hochschulambulanz dieses Quartal noch nicht gewesen sein, lassen Sie Ihre Krankenversichertenkarte in Ihrer Hochschulambulanz einlesen bevor Sie zu uns kommen und geben Sie dort auch einen aktuellen Krankenhauseinweisungsschein/Überweisungsschein ab.
 - ▶ **Uniklinik-externe ambulante Patienten:** Bringen Sie Ihre Krankenversichertenkarte und Krankenhauseinweisungsschein zu uns mit.
- Begleitperson (volljährig)
- Medikamentenplan
- ggf. auswärtig angefertigte Voraufnahmen (MRT, CT oder Röntgen)

Für wen ist die Untersuchung nicht geeignet?

- Allgemeine Kontraindikationen für MRT-Untersuchungen (siehe ***Merkblatt für alle Patienten mit MRT-Untersuchung***)
- Sollten Sie eine Prostatavergrößerung oder ein Glaukom haben, muss auf die Gabe von Buscopan verzichtet werden.

Sollten Sie noch Fragen zu Ihrer Untersuchung haben, sprechen Sie darüber mit Ihrem Arzt.